

Die Kataphorese als unterstützende Methode der Strahlentherapie.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin

verfaßt und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität

zu München

vorgelegt von

Aloys Ansprenger.

1 9 3 4

Rudolph Müller & Steinicke, München

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität München

Referent: Herr Professor Dr. Voltz.

Meiner lieben Mutter in Dankbarkeit!

Disposition :

- A. Elektrolyse und Kataphorese in ihrer Anwendung und biologischen Wirkung am menschlichen Körper.
- B. Das kataphoretisch-elektrolytische Verfahren in der Gynäkologie.
 - I. Die Aufgabe und Applikation des Verkupferungsverfahrens nach Seitz und Wintz.
 - II. Chemische und histologische Untersuchungen über die Verteilung des Kupfers im gynäkologischen Tumor.
 - III. Die Wirkung der Verkupferung nach den Erfahrungen von Wintz.
 - IV. Anwendung der Verkupferung und Zusammenstellung der mit dieser Methode behandelten Fälle am Döderleinschen Bestrahlungsinstitut.
- C. Uebersicht und Zusammenfassung.
- D. Literaturverzeichnis.

Als Ausgangspunkt dieser Arbeit möchte ich erwähnen, daß Apostoli für eine bestimmte Art von dysmenorrhöischen Beschwerden, ferner zur Bekämpfung starker Blutungen von Myomen, die intrauterine Behandlung mit konstantem Strom anwandte, worüber dann auch von manchen Auctoren gute Erfolge berichtet wurden; heute ist dieses Verfahren fast ganz verlassen worden, da es, durch die Verwendung von sondenförmigen Instrumenten und durch eine Ueberdosierung der Strommenge, leicht zu einer starken Aetzwirkung, ja sogar zu Reizblutungen und Pelveoperitonitis kommen kann. Die apostolische Methode fußt auf den Gesetzen der Elektrolyse und zwar kommt am positiven Pol eine Säure-, am negativen Pol eine Alkaliwirkung zustande. Als positiven Pol wählt man eine Metallsonde, die steril ins Uteruskavum einzulegen ist, als negativere Elektrode bedient man sich einer aufs Abdomen angeschallten Plattenelektrode. Die Gründe der Wirkung des elektrischen Stromes am menschlichen Körper beruhen darauf, daß das lebende Gewebe in seiner chemischen Zusammensetzung aus Kolloiden und Kristalloiden besteht; diese sind in Wasser gelöst, suspendiert oder emulgiert und unterliegen für ihren jeweiligen Zustand lediglich dem Flüssigkeitsgehalt des menschlichen Körpers. Die Kristalloide zerfallen wieder in Elektrolyte und Nichtelektrolyte; zu den Ersteren gehören Säuren, Basen und Salze und eines ihrer Merkmale besteht darin, daß sie in Wasser gelöst, dissoziieren, d. h. in elektrisch positive und negative Ionen zerfallen. Demzufolge besorgen die Ionen im menschlichen Körper die Stromleitung; die Wirkung des Stromes aber ist abhängig von Spannung, Stromstärke, Zeitdauer des Stromdurchganges und dem spezifischen Körperwiderstand. Bringt man also eine Elektrolytlösung (z. B. eine Salzlösung) in einen Gleichstromkreis von niederer Spannung (z. B. 6 Volt) mit Hilfe von zwei gleichgroßen Elektroden ein, so fließt der Strom in immer gleicher Stärke durch die Lösung. Die gelösten Salzionen besorgen die Stromleitung, dabei wandern die positiv geladenen Kationen zur Kathode, geben dort ihre Ladung ab und die negativ geladenen Anionen gehen zur Anode, d. h. Salze, Säuren und Basen werden in ihre beiden Komponenten zerlegt. Findet nun

dieser Vorgang in einem Raume statt, so vereinigen sich die beiden Komponenten wieder unter Bildung von Wasser, ist aber eine Scheidewand vorhanden, z. B. der menschliche Körper, so erfolgt die Ablagerung in zwei getrennten Räumen, die zwar strom- aber nicht salzdurchlässig sind. Neben diesen dargelegten Vorgängen der Elektrolyse, findet beim Durchgang von Gleichstrom noch die Kathaphorese statt, worunter man den, durch den elektrischen Strom hervorgerufenen, Transport von Ionen vom positiven zum negativen Pol versteht.

Durch diese Ionenwanderung ist es möglich dem Körper feste Substanzen, wie z. B. Strychnin, Kokain, Salze u. s. w. durch die unverletzte Haut hindurch einzuverleiben.

An Hand von Tierexperimenten fanden nun Seitz und Voltz, daß bei Anwendung schwacher galvanischer Ströme unter entsprechender Lokalisation, das Ovar seine Funktion einstellt, ja sogar zum Absterben gebracht werden kann. Behandelt man also ein Myom mit elektrischem Strom und verkleinert es sich, so wird wohl primär durch den Strom das Ovar beeinflußt werden und dieses als übergeordnetes Organ wird seine Wirkung auf das Myom ausüben. Auch sollen karzinomatöse Tumoren nach den Beobachtungen von Seyderhelm durch den galvanischen Strom allein günstig beeinflußt worden sein.

Und damit kommen wir auf die Zusammenhänge von Kathaphorese und ihrer Wirkung auf Gebärmutterkarzinome zu sprechen. Zur Zeit wird das kataphoretisch/elektrolytische Verfahren in der Gynäkologie hauptsächlich in der Form der Verkupferung von Seitz und Wintz angewendet. Der Grundgedanke geht von der Tatsache aus, daß durch die Einbringung von Schwermetallen oder ihrer Salze in den Tumor (es wurden dazu verwendet: Ag, Kollargol, As, Salvarsan, Pb, Zn, Cu, Au und andere) die Absorption des Tumors für nachfolgende Röntgenbestrahlung erhöht, der Zerfall des Tumors beschleunigt und hierdurch die Heilungsziffer, vor allem der Uteruskarzinome, gehoben wird. Die ersten Versuche mit dieser Methode gehen auf das Jahr 1913 zurück, aber erst seit 1921 wendet Wintz in jedem Fall von Gebärmutterkarzinom, soweit er mit Röntgenstrahlen behandelt, die Verkupferung an.

Die Applikation geschieht folgendermaßen: In die Vagina wird eine Kupferelektrode eingeführt, diese besteht aus einem Hart-

gummirohr, in dessen vorderem Anteil, ein im Durchmesser kleineres Kupferrohr, steckt, das mit einer Anzahl von kleinen Oeffnungen versehen ist und das das Hartgummirohr um ca 10 cm überragt. Der Kupferteil der Elektrode wird mit steriler Gaze umwickelt und in die Vagina eingeführt; in den Hartgummianteil der Elektrode läßt man eine 1% cuprum-selenicum oder cuprum-chloratum Lösung einlaufen. Diese Vaginalelektrode muß fest in der Scheide sitzen, unter Anwendung einer kräftigen Tamponade; wird dies nicht einwandfrei vorgenommen, ist die Möglichkeit tiefergehender Schleimhautnekrosen gegeben. Diese vaginale Elektrode wird mit dem positiven Pol einer Akkumulatorenbatterie verbunden, ein Widerstand regelt die Stromstärke, letzterer muß durch ein Milliampèremeter meßbar sein. Die negative Elektrode ist eine auf den Leib gelegte Tonzelle. Durch passende Lagerung der Elektroden läßt sich jederzeit das zu behandelnde Gewebe in die Bahn der Stromlinien bringen. Vorsicht ist zu üben beim Anlegen der Elektroden, um lokale Schädigungen, wie oben erwähnt, auszuschließen und ferner ist auch darauf zu achten, daß keine Ueberdosierung eintritt, die leicht eine Nierenschädigung nach sich ziehen kann. Auch anamnestisch ist nach einer Nierenschädigung zu fahnden. Um keine Ueberdosierung herbeizuführen gibt Wintz 250—300 MAST an, die man aber nach Guthmann bis auf 600—800 MAST steigern kann.

Wintz berichtet nun an Hand von chemischen und histologischen Untersuchungen, daß durch die in die Scheide eingeführte Anode, Kupfer und Kupferteilchen in das ganze Portiokarzinom hineingebracht werden können und dass auch die Richtung der Kupferverteilung durch die Anlage der Kathode willkürlich verändert werden kann. Ferner wurde von ihm auch Versuche an großen Myomen gemacht, wobei die Kupferuntersuchungen an einzelnen Myomteilen ergaben, daß bei seitlich angelegter Anode nur die entsprechenden Teile des Myoms mit Kupfer durchsetzt wurden. Soweit die Wintz'schen Ergebnisse.

Seit 1926 wurde auch an der Münchener Universitätsfrauenklinik (Direktor Geh. Rat Prof. Dr. A. Döderlein) die Kataphorese nach der Wintz'schen Methode ausgeführt. Es wurden insgesamt 58 Fälle mit Kataphorese behandelt und dabei ausgedehnte histologische und chemische Untersuchungen vorgenommen. Auf letztere

möchte ich zuerst eingehen: Im Fall 2691 (s. beiliegende Tabelle) wurde nach vorher erfolgter Kataphorese eine Portioamputation vorgenommen, dann das Tumorgewebe von Prof. Fischler untersucht und dabei folgender Befund erhoben: ca. 50 g Tumorgewebe wird nach Uebersendung sofort in ein Glas übergeführt und mit 30 ccm Neumannschem Säuregemisch (konz. Schwefelsäure und konz. Salpetersäure) übergossen und über Nacht stehen gelassen, da die Weiterverarbeitung nicht sofort durchgeführt werden konnte. Am nächsten Morgen wurde das Ganze quantitativ in einem Kjeldahlkolben übergespült und Nachwaschen mit dem Säuregemisch und auf einem Sandbad erhitzt bis kein Schäumen mehr auftrat. Später Erhitzung über freier Flamme unter Zuführung von Säuregemisch bis eine fast wasserhelle Flüssigkeit erzielt wird. Nach Abkühlung Neutralisation mit konzentriertem NH_3 , dabei keine Blaufärbung. Nun Ansäuerung mit Salzsäure und Einleiten von Schwefelwasserstoff. Es erfolgt ein minimaler schwarzer Niederschlag; dieser wird qualitativ abfiltriert, mit heißem Wasser nachgewaschen und mit heißer verdünnter Salzsäure gelöst und das Filter chlorfrei gewaschen. Da jetzt die Flüssigkeitsmenge bedeutend geringer ist, wird wieder mit NH_3 übersättigt. Die Flüssigkeit wird jetzt bis auf 10 ccm eingedampft und mit Salzsäure überneutralisiert. Dann Zusatz von Ferrocyankalium. Es tritt eine deutliche bläuliche Färbung auf, über Nacht setzt sich ein geringer Niederschlag von typischen Ferrocyankupfer ab. Es ist also eine Spur von Kupfer im Tumorgewebe vorhanden gewesen, die Wägung des Niederschlags hat 5,3 mg Kuprokaliumferrocyanid, das einer Menge von 0,95 mg reinem Kupfer entspricht, ergeben. Die gefundene Menge an Kupfer war also sehr gering. In mehreren anderen auf dieselbe Weise behandelten Fällen ließ sich aber keine Spur von Kupfer im untersuchten Tumorgewebe nachweisen.

Zum histologischen Nachweis des Kupfers im Tumorgewebe wurde von Dr. Stricker eine große Reihe von Präparaten untersucht. Zuerst wurde Tumorgewebe durch Probeexcision entnommen, histologisch untersucht und festgelegt. Anschließend Kataphorese. 3—4 Tage nach der Kataphorese wurde wieder Tumorgewebe entnommen und histologisch nach Kupfer gesucht. Dabei wurde in keinem einzigen Fall eine wesentliche Aenderung des histologischen Befundes beobachtet.

Aus diesen Untersuchungen am Material der Münchener Frauenklinik geht hervor, daß diese Befunde mit denen von Wintz nicht übereinstimmen und in keinem Fall eine Durchsetzung des Gewebes mit Kupfer eintrat, wie Wintz bei Myomen und in Kystomflüßigkeit nachweisen konnte.

Inwieweit beeinflußt aber die Kataphorese den Tumor selbst? Die Untersuchungen von Seitz und Voltz zeigen wie schon oben erwähnt, daß es im Tierexperiment möglich ist, mit schwachen galvanischen Strömen das Ovar zur Funktionseinstellung zu bringen. Es erscheint nun wahrscheinlich, daß der galvanische Strom als solcher günstig auf die Tumorzelle einwirkt, sodaß diese für die Strahlenbehandlung vorbereitet wird. Es würde also eine Beeinflussung der Tumorzelle im gleichen Sinne, wie sie durch die Röntgen-Radiumbestrahlung hervorgerufen wird, zustande kommen.

Wintz sieht die Wirkung der Verkupferung darin, daß die Rückbildung des Tumors in wesentlich rascherer Zeit (ungefähr in der Hälfte der Zeit als bei alleiniger Röntgenbestrahlung) vor sich geht, ferner daß die Vernarbung und Bildung normalen Gewebes rascher einsetzt; dann bringe auch die Verkupferung eine kräftige Desinfektionswirkung des Tumors mit sich. Es sei eine Schädigung der Karzinomzelle durch die Elektrolyse einerseits und durch das Metall andererseits sicher anzunehmen. Weiterhin werde die Röntgenbestrahlung durch eine Additionsstrahlung, die sich aus Streu- und Eigenstrahlung des Kupfers zusammensetzt, erhöht. Bei seinen Vorträgen in Prag im Oktober 1925 und im Oktober 1926 in Neapel sieht Wintz fernerhin einen großen Vorteil der Verkupferung in der starken Tiefenantiseptis, der durch die Elektrolyse und die Kataphorese tief in das Gewebe gebrachten Kupfer und Kupfersalzteilchen und des Selens (letzteres wirkt als selenige Säure). Anschliessend erwähnt Wintz, daß statistisch nachzuweisen ist, daß gleichartige Fälle mit der Verkupferung einen höheren Prozentsatz an Dauerresultaten ergaben, als ohne Verkupferung. Auch Dehler bestätigt in seiner Arbeit „Beeinträchtigt die Sekundärinfektion im Uteruskarzinom den Erfolg der Strahlenbehandlung“ die Richtigkeit der Wintzschen Annahmen.

Um nun über den wirklichen Wert der Verkupferung als unterstützende Methode der Strahlenbehandlung, ein Bild zu erhalten, habe ich sämtliche Fälle, die an der Strahlenabteilung der Münch-

ner Universitätsfrauenklinik mit der Verkupferung vorbehandelt wurden, einer genauen Durchsicht unterworfen. Es wurden dabei die an dieser Anstalt üblichen Röntgenbestrahlungen und Radiumeinlagen angewandt und als unterstützende Methode neben der Hypophysenbestrahlung und Dextrosidbehandlung, die Verkupferung angewandt. Dabei wurde die Verkupferung hauptsächlich in den Fällen der Gruppe III und IV und in Fällen mit schlechterer Prognose verwendet, da man eine Gefährdung aller Fälle mit guter Prognose durch die oben erwähnten Komplikationen vermeiden wollte. Die jeweils verwendete Zeitdauer der Verkupferung wurde nicht streng schematisiert, sondern nach dem individuellen Verhalten der Patienten abgestuft, d. h. bei Zeichen subjektiver oder objektiver Alteration wurde die Verkupferung abgesetzt.

Um nun genauestens die Resultate der mit Kupfer behandelten Fälle darzustellen und ihre Ergebnisse zu beleuchten, lasse ich die Zusammenstellung dieser Fälle folgen:

Vorrubrik.			Behandlung.			Verlauf.	
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.		Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund	
2621	Gr. II. 26.3.26. 52 Jahre Portio uneben, höckerig, zentral tiefer Defekt, nach r. geschwürige Stelle. Rektal: lk. Param., frei, r. straff. Diag.: Portio Ca. mit Einbruch ins r. Param. Gewicht: 54,2 kg.		1. 1. Einl. 29.3. 27.3.			11. 5. 25. 55,5 kg. Befinden gut. Muttermund geschlossen, Portio formiert, keine Ulzeration. Rekt.: Cervix nach r. verzogen, r. Param. noch etwas infiltriert, lk. frei. 18. 9. 61,5 kg. Vordere Muttermundslippe verlängert, etwas höckerig, hintere atrophisch. Leichte Blutung b. Touchieren. 7. 11. 27. Gest. am Ca.	
2642	Gr. I. 4.5.26. 40 Jahre Portio sehr höckerig, hart. Hintere Lippe defekt, vordere hypertrophisch. Diag.: Portio Ca., das nach rechts auf das vord. Scheidengewölbe übergeht. Gewicht: 58,8 kg.		1. 1. 2.6. 11. 5.			1. 6. 1926 61,5 kg. Status idem. 21. 7. 57,4 kg. Portio höckerig, hypertrophisch, hintere Lippe weggetressen, kraterförmig erweiterter Muttermund, der stark sezerniert. Rektal: Cervix apfelgroß, beide Param. infiltr. 15. 4. 26. Gest. am Ca.	

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.	
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund	
2643	Gr. I. 7.5.26. 36 Jahre Portio sehr derb, Mut- termund lässt Finger- kuppe tief eindringen, Wandung ist zerfallen. Corpus uteri frei be- weglich, beide Param. frei, r. etwas straff. Diagnose: Cervix Ca., Nei- gung nach rechts ein- zubrechen. Gewicht: 53 kg.	1. 4.6.16	1. 11.15.	2. 2.5.26 22.7. 20.7. 87 MAh abgesetzt wegen leichter Ver- brennung 12. 1.	4.6.26 Status idem. Befind. gut. 4. 10. 26. 60,3 kg. Portio etwas plump, nach r. aufgetrieben. Rekt.: Cervix schlank, Param. frei. 11. 1. 1927 60,0 kg. Die ganze vordere Schei- denwand bis zum Schei- deneingang eingenommen von walzenförmigem In- filtrat, das auch die Ure- thra umgreift. 20. 4. 27. Gest. an Rekt- tum Ca.	54,5 kg. gut. kg. kg. kg.
2655	Gr. IV. 20.5.26. 52 Jahr Das ganze Becken ist ausgefüllt von faust- grossem Ca Massen. Portio: hart, plump. Diagnose: Portio Ca Gewicht: 71,6 kg.	1. 30.7. 1926	1. 1.8. 1926	2. 27.7.26. 8.10. 9.10. 120 MAh	29. 7. 1926 65 kg. Status idem. 5. 9. 26 63 kg. Befinden elend, starke Blutungen. Status idem, 7. 10. 62 kg. Portio handtellergröÙ. 27. 3. 1927, Gest. am Ca.	kg. kg. kg. kg.
2661	Gr. Recidiv 31.5.26. Ca 41 J. Links, der Beckenwand adhärenter, unter der Scheid. Schleimhaut ge- legener, harter, unver- schieblicher Tumor. Diagnose: Recidiv ca. scheinbar von einer pa- rametr. Drüse ausgeh- end. Gewicht: 84 kg.	1. 2.6.	1. Einl. 4. 6.	2. 3. 6. 20.7. 21.7. 60 MAh 3. 29.1. 29.9. 1927 1926	20. 7. 1925 65 kg. Oberhalb des Tumors geschwüriger Defekt. 29. 9. Das ursprüngliche Reci- div ist kleiner geworden. 27. II. 27. 84,1 kg. Befinden gut, Scheide völlig komprimiert von einem aus dem Param. herüberreichenden Tumor 6. 7. 27. Gest. am Ca.	kg. kg. kg. kg.
2682	Gr. II. 30.6.26. 39 Jahre Portio erodiert. Vom Rektum aus das lk. Pa- rametr. etwas straff. Diag.: Cervix Ca. Gewicht: 60,7 kg.	1. 1.7. 1926	1. 3.7.	2. 29.9. 24.9. 25.9. 200 MAh 3. 30.9. 4.10. 1927 1927	23. 8. 26. 61,5 kg. Portio plump, verdickt, knollig, Uterus frei be- weglich. 30. 11. 26. 63,5 kg. Scheide nicht verklebt. Param. völlig frei. 27. 9. 1926. 60,7 kg. Vor 3 Wochen Blutung. Man gelangt in einen tie- fen Krater. Rechtes Pa- ram infiltr. 7. 3. 192 Gest. am Ca.	kg. kg. kg. kg.

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.			
Nr.	Gruppe, Aufnahme- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund			
2683	Gr IV. 2.7.25. 64 Jahre Im Grunde der Scheide stenosierender Ring, darüber weiche Portio. Diag.: Ein in das Pa- ram. breit eingebrocche- nes Cervix Ca. Gewicht: 68,5 kg.	1. 5.7.	1. 6.7.		13. 9. 1926. 67 kg. Scheide stenot'sch, Poi- tio atrophisch. 8. 3. 1927. 68,3 kg. Vom Rektum aus, im Becken ein fausgroßer unbeweglicher Tumor. 5. 8. 1927. Gest. am Ca.			
			2. 15.9.	2. 18.7.	3.7.26 80 MAh			
				3. 18. 9. 1926				
2684	Gr. Recidiv 1.7.25. Ca. 32 J. Scheide endet blnd, darüber sind derbe Tu- moren zu fühlen, un- verschieblich. Diag.: Ausgedehntes Narbenrecidiv. Gewicht: 63 kg.	1. 6.7. 9.7. 1926	1. 3.7. 9.7.		2.7.26 110 MAh	16. 8. 25. Gest. am Ca.		
2685	Gr. III. 3.7.26. 33 Jahre Portio plump, zerklüf- tet, direktes Ca. nicht zu fühlen. Rektal: Cer- vix ist schwer zu füh- len. Lks. im Param. derbe Infiltrate. Diag. Ein ins Param. eingebrochenes Cervix Carzinom. Gewicht: 67,8 kg.	1. 6.7. 1926	1. 7.7.		5.7.26 75 MAh	Unvollständig behandelt, da Patientin ausblieb. 5. 7. 27. Gest. am Ca.		
2691	Gr. III. 12.7.26. 46 Jahre Portio in ein großes Ca. Geschwür verwand- elt, besonders hintere Lippe ergriffen. Rektal: Param. bds. frei. Diag.: Ein, von der hinteren Lippe ausgen- endes Portio Ca. Gewicht: 48,4 kg. 14.7.26. Portioamputa- tion zur chemischen Untersuchung der Cup- fermenge.	1. 23.7.	1. 24.7.		2. 20.9.	2. 22.9.	21.7.26 125 MAh	20. 9. 26. 48,3 kg. Vordere Lippe verlängert u. hart, Rektal: Cervix schlank. 21. 2. 1927 50,4 kg. Portio klein, Paramfrei. 26. 5. 30. 53,6 kg. 2. 2. 1932. Patientin lebt und fühlt sich wohl.
2692	Gr. IV. 12.7.26. 54 Jahre Im Grunde der Scheide handtellergrößes Ge- schwür; hypertrophi-	1. 15.7. 1926	1. 17.7.		14.7.26 120 MAh	15. 11. 26. 36,7 kg. Kleines Becken ausgefüllt von Tumoren, an der Vorderwand der Scheide.		

Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.	
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund
	sche Wucherungen. Rektal: lks. Param. bis an die Beckenwand in- filtriert. Diag.: In beide Param. eingebrochenes Portio carcinom. Gewicht: 39,3 kg.	2. 16.11.	2. 18.11. 17.11		gleich hinter dem Introitus, faustgroßer Tumor. Tumor. 20.7.1927. Gest. am Ca.
2.93	Gr.III. 14.7.26. 47 Jahre Portio excentrisch hy- pertrophisch, oberfläch- lich geschwürig, nach hinten geht Ca auf d. Scheidenwand über. Rektal: R. Param. ver- dickt, auch lks. nicht frei. Diag.: Portio Ca, Infil- tration beider Param. Gewicht: 70 kg.	1. 16.7.	1. 17.7.	2. 15.7.26 16.9. 18.9. 110 MAh	15.9.1926. 68 kg. Portio fünfmarks ück- groß. Muttermund krater- förmig; nicht jauchend, aber blutend. Im lk. hinteren Scheidengewölbe Indura- tionen. Rektal: Cervix schwer beweglich, klein- apfelgroß, r. Param. in- duriiert und infiltriert, aber lks. 8.2.1927. 58,5 kg. Man gelangt dicht hinter Introitus in einen jauchi- gen Krater, der von ver- dickten Wänden umge- ben ist. 19.4.27. Gest. am Ca.
2095	Gr.III. 15.7.26. 19 Jahre Portio sehr hart, in d. Mitte ein Krater, von hart. Wänden umgeben. Rektal: Cervix faust- groß, wenig beweglich lk. Param. infiltriert. Diag.: Cervix Ca. Gewicht: 57,8 kg.	1. 21.7.	1. 19.7.	2. 16.7.26 13.9. 9.9. 80 MAh	9.9.26. 57 kg. Im Scheidenhintergrund höckerige, harte Portio. Rektal: Cervix kleinapfel- groß, excentrisch hypertrophisch, r. Param infiltriert, Gegend der l. Beckenwand infiltriert. 8.8.27. Gest. am Ca.
2696	Gr. Primäres Scheiden- Carcinom. 63 Jahre. In der vorderen Schei- denwand, ein bis zur Portio gehendes Ca Rektal: lks. paravagi- nales Zellgewebe unbe- weglich, am Knochen adhärent. Diag.: Von d. vord. Schei- denwand ausgehendes, in das Beckenzellge- webe eingebrochenes, primäres Scheiden Ca. Gewicht: 56 kg.	1. 20.7.	1. 17.7.	2. 15.7.26 17.9. 120 MAh	16.9.26. 50,5 kg. Ganze vord. Scheiden- wand induriert. Rektal: Cervix schlank. Param. frei. Paravaginale Infil- tration im Rückgang. 12.12. Gest. am Ca.

Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium rese	Untersuchungsbefund
2697	Recidiv Ca. 14. 7. 26. 55 55 Jahre. Sehr dicke Portio. Rekt.: Cervix in faust- großen Tumor umge- wandelt, der in beide Param. übergeht und wenig verschieblich ist. Diag.: Recidiv Ca, das die ganze Cervixwand durchbrochen hat und in beide Param. einge- brochen ist. Gewicht: 79,5 kg.	1. 1. 21.7. 22.7. 2. 2. 8.9. 10.11. 160 MAh 3. 3. 9.11. 18.1. 1927	1. 1. 20.7.26 160 MAh	8. 11. 1926. 72 kg. Im oberen Teil der Schei- de eine kraterförmige Höhle, von harten Wän- den umgeben. Rektal: Beckenzellgewebe bds. infiltr. 30. 5. 27. 73 kg. Nirgends mehr etwas v. Ca. fühlbar. 11. 7. 29. 76,8 kg. Scheidenhintergrund ver- klebt. Nicht lösbar. 31. 3. 1930. Gest. am Ca.
2701	Gr.III, 26.7.26. 39 Jahre Anstatt Muttermund ein Krater von harten Wänden umgeben; hin- tere Scheidenwand derb, r. Param. bis an die Beckenwand infil- triert, lks. Param. auch nicht frei. Diag.: Portio Ca, mit Einbruch in b. Param. Gewicht: 52,3 kg.	1. 1. 28.7. 29.7. 2. 2. 27.9. 28.9. 125 MAh	1. 1. 27. 7. 26 125 MAh	27. 9. 26. 53 kg. Scheide nicht verklebt, Portiokrater hat sich ge- reinigt und geschlossen. Rektal: r. Param. infiltr. Lks. retrahiert. 17. 9. 28. 58,8 kg. Portio klein, beide Pa- ram. frei. 7. 2. 30. Status idem. 10. 1. 32. lebt. Befinden gut.
2707	Scheiden Ca 3. 8. 26. 68 Jahre. Scheide verkürzt, vord. und hintere Wand von Tumoren durchsetzt. Scheidenwände infiltr., auch rektal beide Pa- ram., Uterus beweglich Diag.: Scheiden Ca. Gewicht: 61,8 kg.	1. 1. 22.9. 5.8. 2. 18.9.26 27.9. 140 MAh	1. 1. 18.9.26 140 MAh	20.9. 26. 60 kg. Vordere: Scheidengewöl- be induriert, paravesika- les Gewebe induriert. Rekt.: Cervix beweglich, 2. 12. 1926. 55,9 kg. Verklebte Scheide, lösbar. Starre Wände. 12. 4. 1927. Gest. am Ca.
2724	Gr.IV. 5.3.26. 33 Jahre Portio excentrisch-hy- pertrophisch, nöckerig, blutend, Muttermund kraterförmig. Rektal: Cervix höckerig, klein- apfelgroß mit beiden Beckenwänden in Ver- bindung. Diagn.: Cervix Ca mit Einbruch in beide Pa- ram. Gewicht: 41,5 kg.	1. 1. 10.9. 11.9. 9.11.26 140 MAh	1. 1. 11.9. 140 MAh	2. 11. 25. 50,5 kg. In Fingergliedlänge hin- ter dem Introitus, die im- mer noch hypertrophische Portiokrater geschlossen keine Jauchung, aber Blutung. Rekt.: Kleines Becken ausgefüllt von Tumormassen. 5. 3. 1927. Gest. am Ca.

Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.	
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund
2728	Gr.IV. 10.9.26. 57 Jahre. Portio excentrisch hy- pertrophisch, hart. Im r. Scheidengewölbe In- dusation starke Blutung; beide Param. bes. r. infiltriert. Diag.: Portio, Ca, auf Scheide, Param u. Cer- vix übergreifend. Gewicht: 52,7 kg.	1. 15.9.	1. 16.9.		21. 12. 1926. 56,9 kg. Scheide nicht verdickt. Param. frei. 29.3.27. im vorderen Scheidenge- wölbe weicher Knoten, keine Portio. Rekt.: r. Param. hart u. reirahiert, nicht infiltriert. Leichte Blutung. 24. 8. 28. 53,8 kg. Cervix nicht beweglich, im r. Parametrium breit- basige Infiltration. 12. 12. 29. Gest. an Ma- gen Ca. (Metastasen?)
2733	Gr.IV. 20.9.26. 33 Jahre. Portio in apfelförmigen in der Gegend des Muttermundes, ge- schwülig zerfallenen Tumor umgewandelt. Rektal: Cervix klein kindskopfgroß, fest verbunden mit den bei- den Beckenwänden. Diag.: Cervix Ca, das breit in beide Param. eingebrochen ist. Gewicht: 41,4 kg.	1. 23.9.		24.9.26 26.9.26 105 MAH	20. 9. 1926. 41,4 kg. siehe Vorrubrik. 17. 11. 1926. Gest. am Ca.
2736	Gr.IV. 28.9.26. 64 Jahre Portio ist ein fünf-M.- stückgroßer, höcker- iger, wulstiger Tumor. Muttermund geschlos- sen. Rektal: Cervix kleinapfelförmig, unbe- weglich. Diag.: Portio Ca, das die ganze Cervixwand durchbrochen hat und sich in beide Param. fortsetzt. Gewicht: 57 kg.	1. 4.10	1. 2.10.	29.9.26 24.11.25.11. 220 MAH 3. 6.12. 20.5. 1927. 1927.	23. 11. 1925. 55 kg. Scheide weder verklebt noch ulceriert. Keine Por- tio, hint. Lippe fehlt, vordere klein. Rektal bei- de Param. frei, Cervix schlank. 17. 5. 54,8 kg. Sehr harte höckerige Portio. Rektal: harte dicke Cervix. Param. nicht stark infiltriert. 3. 6. 1928. Gest. am Ca. und an Herzwassersucht.
2738	Gr.III. 25.9.26. 36 Jahre Portio hühnereigroßer, zerbröckelnder Tumor.	1. 4.10.	1. 9.10.		24. 10. 1925. 46,3 kg. Scheide nicht verklebt; Portio plump. Rektal:

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund
	Rektal: Cervix kleinap- felgroß. R. Param. frei, lk. Param. infiltr. Diagn.: Portio Ca, das durchbrochen ist und durch die Cervixwand das lk. Param. ergrif- fen hat. Gewicht: 44 kg.	2.	2.	30.9.26 25.11.26.11.280MAh	Cervix aufgetriebe- n, bei- de Param. frei. 4.1.1927. 44,8 kg. Portio noch etwas höcke- rig. Rektal: Cervix auf- getrieben, beide Param. frei. 10.9.28. Gest. am Ca.
2741	Gr.IV, 4.10.26. 48 Jahre An Stelle der Portio jauchender, zerfallender Krater, der auf das vordere Scheidenge- wölbe übergeht. Rektal: kleines Becken mit Tumormassen er- füllt. Diagn.: Von der Portio ausgehendes, zerfallen- des Ca., das breit in beide Param. einge- brochen ist und auf die vordere Scheiden- wand übergegriffen hat. Gewicht: 72,3 kg.	1. 1.12.	1. 6.10.	2. 2. 4.7. u. 9.11. 5.7.26. 600 MAh 3. 7.2. 1927.	29.11.26. 76,1 kg. Krater hat sich ge- schlossen, Ca. greift auf das vordere Scheidenge- wölbe über. Rektal: Cer- vix schlank, r. Param. stark infiltriert. 3.2.1927. 72,5 kg. Im Grunde der Scheide ein von harten Wänden umgebener Krater. Rek- tal: lk. Param. hart, un- bewegliche Massen. 13.9.27. 71,5 kg. Krater hat sich geschlos- sen. Cervix unbeweglich. Beide Param. straff in- filtr. 15.II.1928. Gest. am Ca.
2745	Gr.III, 10.10.26. 51 Jahre Die obere Hälfte der Scheide induriert und mit Wucherungen, die teilweise zerfallen, durchsetzt. Keine Por- tio, anstatt Mutter- mund jauchiger Krater. Diagn.: Portio Ca. auf die Scheide übergrei- fend. Gewicht: 52,0 kg.	1. 19.10.	1. 14.10.	2. 2. 12.10.26 9.12. 10.12. 195 MAh	6.12.1925. 52,7 kg. Obere hintere Scheiden- wand geschwürig, keine Portio, kein Muttermund, keine Jauchung. 28.5.1927. 52,5 kg. Rektum-Scheidenfistel. 31.5.1927. Gest. am Ca.
2746	Gr.IV, 18.10.26 48 Jahre An Stelle der Portio ein handflächen großes, übelriechendes Ge- schwür. Rektal: impo- niert es als faustgroßer Tumor, der die ganze	1. 20.10	1. 26.10.	2. 2. 15.12.u. 17.12 20.12 600 MAh 18.12.	21.III.1927. Laut Mitteilung Befinden schlecht. 26.5.27. Gest. am Ca.

Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.	
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund
	Beckenhöhle ausfüllt u. an die Beckenwände reicht. Diag.: Cervix Ca., das ins Beckenzellgewebe eingebrochen ist. Gewicht: 71,2 kg.				
2752	Gr.I.I. 25.12.26. 57Jahre Im Grunde der Scheide harte, excentrisch hy- pertrophische Portio mit tiefem Defekt. Ca. geht rings auf die Scheide über, Jau- chung. Rektal: Portio plump, parakolpische Verdickungen. Diag.: Portio Ca., mit Uebergang auf das vordere und lk. Schei- dengewölbe. Gewicht: 48,7 kg.	1. 1. 29.10. 30.10. 3. 11.	2. 2. 24.2. 21.2. 1927.	28.10.26. 135 MAH	21.2.1927. 10 kg. Portio vergrößert, hök- kerig, kr.o.g, hart. Nach vorn geht Tumor auf die Scheide über. Rekt. r.: Parametrahirt und pe- ricervical infiltriert. Cer- vix schlank r. Param. ein Knoten, sonst frei. 3.9.1928. Gest. am Ca.
2759	Gr.IV. 8.11.26. 56Jahre Portio in einen excen- trischen, hypertrophischen, höckerigen Tumor umgewandelt, der auf die Scheide übergreift. Rekt: Cer- vix nach lks. verzogen, in einen klein- kindskopfgroßen Tu- mor verwandelt, der fest mit der Becken- wand verwachsen ist. Rechtes Param. infil- triert. Diag.: Portio Ca., auf die Scheide übergrei- fend, die Cervixwand durchwucherndes, in b. Param., eingedr. Ca. Gewicht: 64,2 kg.	1. 1. 17.11 18.11.	2. 2. 14.1. 12.1.	10.11.26 490 MAH	11.1.1927. 58 kg. Scheide sehr eng. Rts. fühlt man Infiltrat, das von der Portio auf die Scheide übergeht. Rekt- tal: Paravag. u. paracerv. Gewebe karzinoma- tös infiltr. In der Cer- vix tiefegehender Krater. 17.5.1927. Gest. am Ca.
2775	Gr.IV. 21.11.26. 45Jahre Makroskopisch: kein Befund. Histol. Diag.: Corpus Ca. Gewicht: 57,7 kg.	1. 1. 10.12. 4.12.	2. 2. 24.1. 26.1.	30.11.26 u. 1.12.26. 435 MAH	26.1.1927. 49,3 kg. Portio unebenes Gebilde, Finger kommt in einen tiefen Krater, lk. Param. stark infiltriert. r. retra- hiert. 31.8.1928. Gest. am Ca.

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapno- rese	Untersuchungsbefund
2777	Gr.IV. 6.12.29. 56 Jahre Portio ist hartes. flächen- haftes Geschwür, Ue- bergang links und vorn auf die Scheide. Rek- tal: Cervix faustgroßer Tumor, lk. Param. in- filtr. Diag.: Portio Ca. Gewicht: 58,7 kg.	1. 10.12.	1. 15.12.	2. 7.12.26. 8.2. 1000 MAh 1927.	1. 2., 1927. 54,8 kg. Im Scheidenhintergrund eine, von der vorderen Scheidenwand bis ins hintere Scheidengewölbe reichende geschwürig zerklüftete Fläche. 30. 6. 1927. Gest. am Ca.
2783	Gr.IV. 28.12.26. 35 Jahre Hypertroph. Portio, Finger kommt in einen Krater hoch hinauf. Rektal: faustgroßer Tumor, der lks. an d. Beckenwand reicht. Diag.: Cervix Ca., d. lks. ins Param. aus- strahlt. Gewicht 38 kg.	1. 4.1.	1. 2. 1.	2. 30. u 31. 21. u. 24.2. 700 MAh 22. 2.	21. 2. 1927. 41 kg. Das ganze Becken von harten Tumoren erfüllt. 13.5. 1927. Gest. am Ca.
2787	14. 1. 27. Gr. Primäres Scheiden- Carcinom 48 Jahre Scheide in der Mitte starkverengt, im vorderen Scheidengewölbe breite Infiltration, d.bis zum Scheideneingang reicht. Diag.: Primäres Schei- den-Carcinom, mit Ue- bergreifen auf d. hin- tere Blasenwand. Gewicht: 51,1 kg.	1. 19.1. 31.1.	1. 17.1.	2. 14. u. 16. 1. 1927. 4.3. 5.3. 200 MAh	3. 3. 1927. 52,7 kg. Vordere Scheidenwand noch geschwürig und derb infiltriert besonders rechts. Rektal: Infiltration d. vorderen Scheiden- wand, mit der hinteren Blasenwand verschmol- zen. 29. 6. 1927. Gest. am Ca.
2788	17. 1. 1927. Gr. IV. 51 Jahre Im Grunde der Scheide handflächengroßes Ge- schwür, greift lks. auf die Scheide über. Rek. Lks. Param. bis zur Beckenwand infiltr., r. auch nicht frei. Diag.: Portio Ca. mit Einbruch in das lk. u. hintere Scheidenge- wölbe und Beckenzell- gewebe. Gewicht: 63,5 kg.	1. 20.1.	1. 24.1.	18.1.27. 730 MAh	22. 3. 1927. Gest. am Ca.

Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium rese	Untersuchungsbefund
2791	17. 1. 27. Rec'div Ca. 49 Jahre In der Scheidenwand lks. Tumor, höckerig, 1. Beckenzellgewebe breit infiltr. b.s an die Beckenwand. Diag.: Narbenrezidiv, das in das Beckenzell- gewebe eingedrungen ist. Gewicht: 57,3 kg.	1. 1. 26.1. 24.1. 650 MAh 2. 2. 9.3. 7. 3. 3. 30.6.	1. 1. 23.2. 4. 2. 2. 2. 1.2. u. 7. 16.3 18.3. 2.2. 27. 600 MAh 3. 3. u. 4. 9.27.	7. 3. 27. 62,5 kg. Scheide in der Mitte zir- kular verengt. Rek.: lks., an d. Beckenwand Resi- stenz. Tumor is. kleiner und härter geworden. 12. 5. 27. 63 kg. Scheide sehr eng, sta- id. 18. 4. 1928. Gest. am Ca.
2799	23. 1. 1927. Gr.IV.Scheiden Ca. 39 Jahre. Im Grunde der Scheide höckerige, geschwürige Fläche. Diag.: Primäres Schei- den Ca. das bis z. Harn- röhrenmündung heran- geht. Rektal: Becken- zellgewebe frei. Gewicht: 50 kg.	1. 1. 23.2. 4. 2. 2. 2. 1.2. u. 7. 16.3 18.3. 2.2. 27. 600 MAh 3. 3. u. 4. 9.27.	1. 1. 23.2. 4. 2. 2. 2. 1.2. u. 7. 16.3 18.3. 2.2. 27. 600 MAh 3. 3. u. 4. 9.27.	17. 3. 27. 52,5 kg. In der vorderen Schei- denwand, ein von der vorderen Lippe bis zum Urethralwulst reichendes Infiltrat, das geschwürig zerfallen ist. 18. 5. 27. 54,3 kg. Defekt ist kleiner ge- worden. 9. 11. 27. Gest. am Ca.
2805	7. 2. 27. Gr. IV. 78 Jahre Scheide im hinteren Abschnitt trichterförmig verengt. Portio atrophisch, Mutter- mund für Fingerkuppe einlegbar, Ränder höckerig. Rekt.: Cervix aufgetrieben, r. Param infiltr., auch links. Diag.: Portio Ca., das Cervixwand durchbro- chen hat und in die Param. eingedrungen ist. Gewicht: 63,2 kg.	1. 1. 11.2. 8.2. 2. 2. 270 MAh 5.4. 6. 4.	1. 1. 11.2. 8.2. 2. 2. 270 MAh 5.4. 6. 4.	5. 4. 27. 60,5 kg. Vaginalstatus idem. Rek.: Cervix schlank, lk. Param. retrahiert u. per cervical leicht infiltriert, r. Param frei. 3. 11. 27. 52,3 kg. Portio zerfressen, Ca. geht auf hinteres Schei- dengewölbe über. Beide Param. ergriffen. 27. 10. 1928. Gest. am Ca.
2827	28. 2. 27. Gr. III. 63 Jahre. excentrisch hypertro- phische Portio, hart. Cervix faustgroß, wenig beweglicher Tu- mor. Param. frei. Diagnose: Cervix Ca. Gewicht: 70 kg.	1. 1. 4.3. 7.3. 2. 2. 3. 1927. 21.4. 22.4. 600 MAh	1. 1. 4.3. 7.3. 2. 2. 3. 1927. 21.4. 22.4. 600 MAh	27. 6. 27. 73,1 kg. Keine Portio, Rektal: Beide Param retrahiert, aber nicht infiltriert. Cer- vix schlank. 30. 11. 1927. Status idem. 21. 3. 30 Status idem. 2. 4. 1932 Patientin gibt gute Nachrichten.

	Vorrubrik.	Behandlung.		Verlauf.	
Nr.	Gruppe, Aufnahmebe- fund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund
2835	15. 3. 1927. Gr. III. 33 Jahre. Portio geschwürig, zer- fallen, Prozeß greift auf das vordere Schei- dengewölbe über lks. Param infiltr., rechtes P. frei. Diagnose: Portio Ca. Gewicht 42,5 kg.	1. 21.3.	1. 30.3,	16. u.17. 3.1927. 600 MAh	22. 3. 27. 42,5 kg. Statt Portio Karzinoma- töser Krater, von harten Wänden umgeben, Karzi- nom geht ringsum auf die Scheide über. Cervix faustgroßer Tumor. Pa- ram. r. mehr als lks. in- filtr. 11. 12. 27. Gest. am Ca.
2846	2. 4. 1927. Gr. IV. 50 Jahre. Portio 5 Markstück- großes, jauchendes, tendes Geschwür, das rings auf Scheide über- greift. Rekt.: Cervix aufgetrieben, l. Param, völlig infiltr. Infiltrat greift auch auf die Blase über. Diag.: Weit vorge- schrittenes Portio Ca. Gewicht: 9,8 kg.	1. 6.4.	1. 9. 4.	5.4. u. 4.5.27. 650 MAh	23. 5. 27. 72 kg. Krater hat sich geschlos- sen, Portio geschrumpft, keine Jauchung. Rekt.: Cervix unbeweglich, lks. Param. ebenfalls hart. 23. 7. 27. 70 kg. Portio bröckeliger Kra- ter lks. u. r. Param. straff infiltriert. 29. 3. 23. Gest. am Ca.
2849	6. 4. 1927. Gr. III. 62 Jahre. keine Portio, im Schei- dengrund höckerig ge- schwurig, zerfallende Masse, Rektal: r. Pa- ram. infiltr., Cerv. hy- pertrophisch, Diag.: Portio Ca., auf Scheide u. r. Param. übergehend. Gewicht: 49,5 kg.	1. 7.4.	1. 9. 4.	2. 30.5.	30. 5. 1927. 50,8 kg. Scheide ohne Substanz- verluste. Blutung. Rekt.: Cervix schlank, im r. Pa- ram. Kroten, lks. frei. 28. 7. Status idem. 3. 7. 23. Gest. am Ca.
2879	19. 5. 1927. Gr. IV. 59 Jahre An der vorderen Schei- wand eine knotenför- mige Verdickung, kei- ne Portio, Muttermund umgeben von harten supravag. gelegenen Knoten. Rekt.: Portio dick, wenig bewegl., l. Param bis an die Beckenwand infiltr., r.	1. 24.u. 30.5.	1. 27.5.	2. 12. 7.	12. 7. 27 62,1 kg. Scheide verklebt. Rekt.: keine Infiltration im Bek- ken. 15. 5. 1928. 73 kg. Scheide verklebt, schwer lösbar. 21. 5. 1930. 71 kg. Scheide status idem, beide Param. frei.

Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebefund und Diagnose.	Rönt- genb.	Meso- Radium rese	Untersuchungsbefund
	Param. karzinoma ⁴ . infiltr. Cervix Ca., in beide Param. durchgebrochen und sich auf die Blase fortsetzend. Gewicht: 63,5 kg.			
2880	18. 5. 1927. Gr. IV. 43 Jahre Harte Geschwürsfläche, die Portio einnimmt u. längs d. vord. Scheidenwand bis z. Vulva reicht. Rekt.: Becken ausgefüllt mit harten, unbew. Massen. Diag.: Portio, Ca., in beide Param. eingebrochen u. auf d. vord. Scheide wand übergehend. Gewicht: 56,6 kg.	1. 25.5.	1. 23. 5. 2. 2. 8. 7. 6. 7. 20.u. 21. 5.1927. 3. 400 MAh 9. 7.	6. 7. 1927. 55,6 kg. Gleich hinter d. Introitus stößt man auf b öckelige Massen, die das ganze Scheidergewölbe einnehmen und zur Blase zu durchbrechen. Auch im hint. Scheidengewölbe harte, knollige Massen. Rekt.: das ganze kleine Becken ausgemauert. 10. 1. 1928. Gest. am Ca
2899	26. 6. 1927. Gr. III. 55 Jahre Im Scheidengrund handtellergroßes Geschwür in der Mitte Krater. Ca. greift vorn auf Blase u. Scheide über. Rekt.: Beide Param. infiltr., etwas beweglich. Diag.: Cervix Ca., in beide Param. eingebrochen. Gewicht: 82 kg.	1. 27.6.	1. 25.6. 600 MAh	6. 9. 1927. 73,3 kg. Finger kommt in jauchenden, tiefen Krater, der nach vorn n. durch eine dünne, von der Blase getrennt ist. R. Param. mit Tumormassen erfüllt, auch l. Param. infiltr. 10. 1. 1928. Gest. am Ca.
2901	22. 6. 1927. Gr. III. 40 Jahre. Im Grunde d. Scheide handflächengroßes, karzinomöses Geschwür; in d. Mitte ein Krater. Ca. geht vorne und r. auf Scheide u. Blase über. Rekt.: Beide Param. infiltriert. Diag.: Portio Ca., auf Scheide u. Blase übergehend u. in beide Param. eingebrochen. Gewicht: 53,7 kg.	1. 1.7.	1. 12.7. 2. 2. 21.7. 12.9. 23.u.24. 6.1927. 3. 3. 16.u. 700 MAh 8.9. 22. 11.	21. 7. 1927. 5 Markstück große, höckerige Portio, d. beim Touchieren blutet. Rekt.: Cervix apfelgroß, bewegl. beide Param. infiltr., Krater hat sich zurückgebildet. 16. 11. 1927. 53 kg. Scheide leicht verklebt. R. Param. etwas infiltr. 6. 4. 1927. Gest. am Ca

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebefund und Diagnose.	Röntgenb.	Meso-Radium	Kataphorese	Untersuchungsbefund
2905	21. 6. 1927. Gr. IV. 56 Jahre Diag.: Portio Ca., weit fortgeschritten. Gewicht: 68,1 kg.	1. 1.7. 2. 4.10.	1. 4.7. 2. 5.10.	27.6.27. 400 MAh	3. 10. 1927. 67,4 kg. Gleich hinter d. Introitus vaginae kommt man ins Rektum, Portio ist ein großer Krater, von harten Wänden umgeben. Rekt.: Cerv. völlig unbeweglich. 20. 7. 1923. Gest. am Ca
2956	20. 9. 1927 Gr. III. 62 Jahre Portio dick und plump, an Stelle Muttermund Krater. Rekt.: Cerv. faustgroß, l. Param. infiltr. Ca. greift auf Scheide u. Blase über. Diag.: Portio Ca., ins l. Param. einbrechend u. a. Scheide übergehend. Gewicht: 80 kg.	1. 22.9. 2. 9.11.	1. 24.9. 2. 10.11. 3. 20. 6. 1928,	20.9.27 500 MAh	8. 11. 1927. 87 kg. Scheide nicht verklebt, kein Krater mehr. Rekt.: Cerv. noch etwas plump, l. Param. nicht ganz frei. 17. 8. 1928. 81,5 kg. Portio plump, leichte Blutung l. Param. starr infiltriert. R. Param. weniger. 8. 10. 1923. Gest. am Ca
2935	14. 11. 1927. Gr. III. 60 Jahre Portio zerklüftet Rekt.: l. Param. bis an die die Beckenwand infiltr. Diag.: Cerv. Ca., das auf Scheide, Blase u. l. Param. übergegangen ist. Gewicht: 59 kg.	1. 16. 11. 2. 21. u. 22. 12.	1. 19. 11. 2. 23. 12.	600 MAh	21. 12. 1927. 55,8 kg. Portio zerklüftet, Rekt.: status idem. 11. 3. 1928. Gest. am Ca
2991	22. 11. 1927. Gr. III. 33 Jahre Scheideng. und ist eine geschwürig zerfallene Fläche, d. überaß auf Scheide übergeht. Rekt.: r. Param. strangförmig bis zur Beckenwand infiltr., auch l. etw. infiltr. Diagn.: Portio Ca., d. auf die Scheide übergeht u. sich ins r. Param. fortsetzt. Gewicht: 61 kg.	1. 25. u. 28. 11. 2. 18. 1. 1928.	1. 29. 11. 2. 20. 1.	300 MAh	17. 1. 1928. 63,7 kg. Keine Portio, Scheide status idem, Rekt.: r. Param. retrahiert, lks. frei. 21. 3. 1928. 63,7 kg. Keine Portio, keine Substanzdefekte. Rekt.: r. Param. etwas hart, lks. frei. 21. 7. 1930. Nachricht: Befinden gut. 10. 2. 1932. Befinden gut.
3016	5. 1. 1928. Gr. IV. 55 Jahre Portio faustgrosser,	1. 13. 1.	1. 23. 1.	9. 1. 28. 300 MAh	12. 3. 1923. 39,5 kg. Portio faustgrosser Tumour, d. auf praeviesika-

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.
Nr.	Gruppe, Ausnahme- fund und Diagnose.	Rönt- g.enb.	Meso- Radium	Katapho- rese	Untersuchungsbefund
	bröckeliger Tumor, hint. Scheidengewölbe infiltr. Rekt.: Cervix Kindskopfgroß, r. u. l. Param. bis z. Becken- wand infiltriert. Diag.: Cerv. Ca., Ein- bruch in r. u. l. Pa- ram., Uebergang auf Scheide u. Blase. Gewicht 42,5 kg.				les Gewebe übergeht. Rekt.: status idem. 23. 5. 1923. Gest. am Ca.
3031	3. 2. 1928. Gr. IV. 54 Jahre Im Scheidengrund großes Ca. Geschwür, greift auf hint. Schei- dengewölbe über. Rekt.: Cerv. Ca., in beide Param. einge- brochen. Gewicht: 66 kg.	1. 10.2.	1. 16.2.		2. 7. 23. 65 kg. Scheide nicht verklebt, Portio dick u. wulstig. Rekt.: Kindskopfgroßer nicht bewegl. Tumor. 27. 1. 1929. Gest. am Ca.
3037	14. 2. 1928. Gr. IV. 57 Jahre Portio dick u. hart, Rekt.: Cerv. faust- groß, Beckenhöhle aus- gefüllt mit unverschieb. Tumoren. Diag.: Cervix Ca. Ein- bruch in beide Param. Gewicht: 63 kg.	1. 20.2.	1. 22.2.	16.2.28. 450 MAh	22. 7. 1928. Gest. an Ne- phritis.
3044	22. 2. 1928. Gr. III. 53 1/2 Jahre Statt Portio hartes, handtellergr. Geschwür vord. Lippe derb u. d'ck, h'ntere teilt. Lks. geht Ca. auf Scher- de über, Rekt.: Cervix füllt als Tumor die Beckenhöhle aus. Diagnose: Portio Ca., Cervixwand durchset- zend, Einbruch in bei- de Param. Gewicht: 58 kg.	1. 28.2. 1928	1. 2.u. 8.3.	2. 2. 24.2.28. 23.4. 19.4. 500 MAh	17. 4. 1928. 58,5 kg. Keine Portio, Rekt.: bei- de Parametrien straff, aber nicht infiltr. Cer- vix schlank. 16. 6. 28. 59,7 kg. l. Param. hart infiltr. Cervix schlank. 17. 4. 1930 Gest. am Ca.
3092	1. 5. 1923. Gr. III. 51 Jahre Statt Portio Ca.-Krater,	1. 3.u.4.	1. 5.5.		19. 6. 1923. 51,6 kg. Vord. Muttermundlippe noch dick u. höckerig,

Vorrubrik.		Behandlung.			Verlauf.
Nr.	Gruppe, Aufnahmebefund und Diagnose.	Röntgenb.	Meso-Radium	Kataphorense	Untersuchungsbefund
	Ca. geht rings auf Scheide u. nach vorn auf Blase über. Rekt.: r. Param. bis zur Beckenwand infiltr. Diag.: Cervix Ca., br. ins r. Param. eingebrochen. Gewicht: 45 kg.	2. 26.6.	2. 19.6.	1.u.2. 5.1928. 3. 400 MAh 20. u. 22. 9. 28.	Krater hat sich geschlossen. R. Param. u. Parakolpus s'arr infiltriert, l. Param. frei. 2. 5. 1929. Gest. am Ca
3093	2. 5. 1928. 52 Jahre Primäres Scheiden Ca. Am Introitus harte Einlagerung, der von d. d. Kommissur ganz n. vorn geht. In d. Scheide hartes Ca. Geschwür, das ins perivag. Gewebe übergeht. Diag.: Primäres Scheiden Ca. mit Vulva Metastasen Gewicht: 60,4 kg	1. 75	1. 9.2.	2. 2. 3.5.28. 27. u. 29.6. 400 MAh 28.6. 3. 6. 12.	27. 6. 1928. 60,5 kg. Dicht hint. Introitus eine Strikur, kein Fornix, keine Portio. Rekt.: Im Umkreis d. Strikur derbes d. Knochen adnarentes Infiltrat. 7. 2. Status idem. Rekt.: Im Becken kindskopfgroßer Tumor. 2. 1. 1930. Gest. am Ca.
3156	11. 7. 1928. Metastasen. Gewicht: 60,4 kg. Gr IV. 51 Jahre Muttermund läßt Finger nicht eindringen, kommt über auf derbes Gewebe, Rekt.: faustgroßer, unverschieblicher Tumor. Diag.: Cervix Ca., das sich über dem gesunden Muttermund entwickelt. Gewicht 72 kg.	1. 24.7.	1. 2.8.	2. 2. 13.7.28. 27.9. 28.9. 450 MAh 3. 7. 12.	25. 9. 1923. 66,8 kg. Scheide kurz und eng, keine Portio, kein Krater, Rekt.: Cerv. mannsfaustgroß, breite Infiltration z. rechten Beckenwand ziehend, l. Param. weniger infiltriert. 25. 10. 1929. Gest. a. Ileus.
3157	11. 7. 1928. Gr. IV. 50 Jahre Statt Portio ein großer Krater, d. von harten Wänden umgeben ist, die nach lks. einen stark vorspringenden Tumor in d. Krater darstellen. Rekt.: Cerv. mannsfaustgroßer, kaum noch verschieblicher Tumor.	1. 27.7.	1. 24.7.	2. 2. 14.7.28. 26.9. 28.9. 600 MAh	25. 9. 1923. 59,6 kg. Statt Muttermund ein f. d. Finger durchgängiger, höckeriger Krater, Rekt.: Cerv. aufgetrieben bei de Param. noch etwas infiltriert. Jauchung 10. 12. 1923. Gest. am Ca.

Nr.	Vorrubrik.		Behandlung.		Verlauf.	
	Gruppe,	Aufnahmebefund und Diagnose.	Rönt-	Meso- Katapho- genb. Radium rese	Untersuchungsbefund.	
		Diag.: Cervix Ca., das durch die ganze Cervixwand durchgebrochen ist. Gewicht: 60,9 kg.				
3164	12. 7. 1928.	Gr. IV. 43 Jahre An Stelle Portio u. Cervix großer Krater von harten Wänden umgeben. Rekt.: beide Param. ergriffen. Diag.: Cervix Ca., durch d. Cervixwand durchgebrochen, Kraterbildung, jauchender Zerfall. Gewicht: 41,5 kg.	1. 1. 24.7. 16.7.	16.7.28. 700 MAh	24. 9. 1923. 41,2 kg. Hintergrund der Scheide u. Vorderwand bis dicht zum Introitus von einem handtellergroßen Geschwür eingenommen, Rekt.: Kleines Becken ausgemauert v. Tumoren. 10. 11. 1928. Gest. am Ca.	
3171	22. 7. 1928.	Gr. IV. 49 Jahre Im Scheidengrund ein Infiltrat, ringsherum bes. nach vorn, gegen d. Blase zu, Rektal: Becken erfüllt von harten unverschieblichen Tumoren. Diagnose: Portio Ca. Gewicht: 48 kg.	1. 1. 31.7. 4. 8. 1.8. 2. 2. 25.7.28. 22.9. 500 MAh 19. u. 24.9. 3. 3. 3.12. 30.11.		18. 9. 1923. 49,5 kg. Im Scheidengrund derbe Infiltrate. Rekt.: Cervix kindskopfgroß, beide Param. bis z. Beckenwand infiltriert, 26. 4. 1929. 58,2 kg. Scheide endet blind. Am vorderen Scheidengewölbe kleines Infiltrat. Hinten ein in d. Scheidenwand hinein vordrängender Tumor. Rekt.: hintere Scheidenwand infiltriert, das Infiltrat dehnt sich nach d. r. Param. aus, auch im Douglas harte Infiltrate. 24. 1. 1930. Gest. am Ca.	
3227	4. 10. 1928.	Gr. IV. 53 Jahre Portio ist umgewandelt in handflächengroßes Geschwür; in d. Mitte ein Krater, d. den Finger hoch eindringen läßt. Rekt.: das ganze Becken ausgemauert v. harten Tumoren, Diag.: Portio Ca., Uebergang auf d. Scheide und Einbruch in d. lk. Beckenzellgewebe. Gew.: 44 kg.	1. 1. 8.10 11.10. 2. 2. 5.10.28. 30.11. 28.11. 400 MAh		27.11. 1923. 24 kg. Portio relativ gut formiert. Rekt.: in beiden Param. noch weitgehende Infiltrate. 12. 2. 29. 42 kg. Portio ist umgewandelt in ein handtellergroßes Geschwür, d. Septum vaginale infiltr., d. ganze Becken ausgemauert. Weitere Nachricht fehlt.	

Zusammenfassung :

Mit dem kataphoretischen Verfahren wurden demgemäß 58 Fälle behandelt, von diesen entfielen also auf:

	Gruppe	behandelte Fälle	gestorben	es leben
I. Portiocarcinom	I	1	1 an Ut. Ca.	0
	II	1	1 an Ut. Ca.	0
	III	12	9 an Ut. Ca.	3
	IV	14	13 an Ut. Ca. (über einen Fall ist nichts zu erfahren.)	
II. Corpuscarcinom	IV	1	1 an Ut. Ca.	0
III. Cervixcarcinom	I	1	1 an Ut. Ca.	0
	II	1	1 an Ut. Ca.	0
	III	6	5 an Ut. Ca.	1
	IV	12	9 an Ut. Ca. 1 an Nephritis 1 an Ileus	1
IV. Rezidivcarcinom		4	4 an Ut. Ca.	0
V. Scheidencarcinom		5	5 an Vag. Ca.	0

Von den 3 lebenden Patientinnen, die an Portiocarcinom der Gruppe III erkrankt waren, leben nach der Behandlung 2 Fälle länger als 5 Jahre (Fall 2691 und Fall 2701), dürfen also als geheilt betrachtet werden; Fall 2991 lebt seit $4\frac{1}{4}$ Jahren nach der Behandlung und gibt gute Nachrichten.

Von den behandelten Fällen mit Cervixcarcinom der Gruppe III lebt eine Patientin (Fall 2827) länger als 5 Jahre, von den Fällen mit Cervixcarcinom der Gruppe IV lebt eine Patientin (Fall 2879) seit 4 Jahren, gibt aber später keine Nachricht mehr.

Zur kritischen Auswertung des Verkupferungsverfahrens nach den Erfahrungen am Döderleinschen Institut wäre demnach zu sagen: I. Eine Rückbildung des Tumors in wesentlich rascherer Zeit (Wintz spricht von der Hälfte der Zeit als bei alleiniger Röntgenbestrahlung) findet durch die Verkupferung nicht statt. Aus den Erfahrungen und Veröffentlichungen des Döderleinschen Instituts geht hervor, daß die Rückbildung eines Gebärmuttercarzinoms — wenn das Karzinom überhaupt auf Bestrahlung ansprach — bei den Fällen ohne Verkupferung in ungefähr der gleichen Zeit vor sich ging, als mit dem Kataphoretischen Verfahren.

II. Bei den wenigen hier angeführten Fällen, in denen es nach der Verkupferung und Bestrahlung zur Bildung normalen Gewebes und zur Heilung kam, ist es schwer zu sagen, ob dieser Verlauf der Kataphorese zu Gute gerechnet werden darf; eine Gegenüberstellung mit den Fällen des Döderleinschen Instituts, die nicht mit Verkupferung behandelt wurden, zeigt, dass die Vernarbung und Bildung neuen Gewebes bei entsprechenden Fällen keineswegs länger dauerte und der Heilungsprozeß ungefähr in derselben Zeit erfolgte.

III. Die Tiefendesinfektionswirkung durch die Verkupferung steht ohne Zweifel fest. Besonders gute Erfolge brachte das Verfahren bei jauchenden, geschwürigen Tumoren, wie dies die Fälle 2693, 2701, 2724, 2741, 2745, 2846, 2956, 2991, 3228, zeigen. Schon kurze Zeit nach der Verkupferung setzte eine Reinigung der karzinomatösen Geschwüre ein und die Jauchung hörte auf. Wenn durch die Verkupferung auch eine gute Desinfektionswirkung erzielt wurde, so konnte jedoch bei den Fällen des Döderleinschen Instituts, durch chemische Untersuchung nur einmal eine geringe Menge Kupfer nachgewiesen werden, die histologische Untersuchung ergab stets negative Resultate.

IV. Wintz nimmt eine Schädigung der Karzinomzelle durch die Elektrolyse einerseits und durch das Metall andererseits an. Dagegen spricht am Material der Bestrahlungsabteilung der Münchener Frauenklinik der Befund der histologischen Untersuchungen Strickers, der in allen untersuchten Fällen (2691, 2707, 2738, 2745, 2746, 2752, 2759, 2777, 2783, 2787, 2788, 2805, 2827, 2846 und 2879) keine histologischen Veränderungen des Tumorgewebes nach der Verkupferung nachweisen konnte.

V. Die Angabe von Wintz, daß statistisch nachzuweisen ist, daß gleichartige Fälle mit der Verkupferung einen höheren Prozentsatz an Dauerresultaten ergäben, als ohne Verkupferung widerlegt die Zusammenstellung der 58 mit diesem Verfahren behandelten Fälle des Döderleinschen Instituts. Wohl ging nach der Verkupferung die Jauchung und Ulcerierung des Tumors zurück, wohl reinigte sich das Geschwür in kürzerer Zeit als ohne Verkupferung, nicht aber wurde durch die Wintzsche Methode der Prozentsatz an Dauer-

resultaten bei entsprechenden Fällen gehoben, was aus dem Vergleich mit den Veröffentlichungen des Döderleinschen Institutes, die ohne Verkupferung behandelt wurden, zu entnehmen ist.

Als Resultat dieser Untersuchung ergibt sich also:

Durch die Verkupferung findet weder eine Rückbildung des Tumors in wesentlich kürzerer Zeit, noch eine schnellere Vernarbung und Bildung neuen Gewebes, noch eine Schädigung der Karzinomzelle, noch ein höherer Prozentsatz an Heilungsergebnissen in gleichgelagerten Fällen, als ohne das Wintzsche Verfahren, statt; eine Desinfektionswirkung durch die Verkupferung steht ohne Zweifel fest.

Diese Ergebnisse und Erfahrungen konnten die Erwartungen, die man in die Verkupferung nach der Methode von Seitz und Wintz setzte, nicht bestätigen; deshalb bringt das Döderleinsche Institut der Münchner Frauenklinik dieses Verfahren seit dreieinhalb Jahren nicht mehr in Anwendung.

Literaturverzeichnis.

- Dehler, Beeinträchtigt die Sekundärinfektion im Uteruskarzinom den Erfolg der Strahlentherapie. Strahlentherapie Bd. 31.
- Döderlein, Therapie der gynäkologischen Krebse mit radioaktiven Substanzen, Strahlentherapie Bd. 25.
- Döderlein-Krönig, Operative Gynäkologie Aufl. V.
- Guthmann, Physikalische Heilmethoden. Halban Seitz Bd. II.
- Thiemann, Resultate der Röntgentherapie chirurgischer Erkrankungen. Strahlentherapie Bd. 30.
- Wintz, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung des Karzinoms, Strahlentherapie Bd. 21.
- Wintz, Gründe für Mißerfolge in der Strahlentherapie des Karzinoms. Strahlentherapie Bd. 25.
- Voltz, Strahlenbehandlung der weiblichen Genitalkarzinome, 13. Sonderband der Strahlentherapie.

Herrn Professor Dr. Voltz bin ich für die Ueberlassung und Anregung zu dieser Arbeit zu großem Dank verpflichtet und möchte diesen auch aussprechen für die freundliche Unterstützung durch Rat und Tat.

Lebenslauf:

Ich, Aloys Ansprenger, wurde in München als Sohn des Architekten und Baumeisters Franz Ansprenger, am 18. Februar 1905 geboren, besuchte nach 4 Jahren Volksschule, das Max-Gymnasium und später das alte Realgymnasium in München und erlangte dort am 1. April 1925 das Reifezeugniß. Nach einer praktischen Tätigkeit widmete ich mich bis zum Sommer-Semester 1926 dem Studium der Architektur an der Münchner Technischen Hochschule. Hierauf wechselte ich zum Studium der Medizin über, studierte an den Universitäten München und Würzburg und legte dort im Februar 1929 das Physikum ab. Im Sommer-Semester 1929 besuchte ich die Universität Wien und vollendete dann meinen Studiengang in München mit dem Staatsexamen im Juni 1932.

